

Recommandations après un Traitement de Racine

Vous venez de bénéficier d'un traitement de racine.

A l'intérieur des racines il y a des canaux creux qui contiennent les nerf et les vaisseaux. Le traitement consiste à nettoyer tous les tissus putrescibles, à désinfecter et à remplir ces canaux avec un matériau inerte et étanche.

Ce traitement permet ainsi

- de soulager les douleurs
- d'éviter des infections au bout des racines
- de préserver les tissus de soutien de la dent: (Gencive et os).

La désinfection et l'obturation des canaux radiculaires, peuvent provoquer une irritation.

Si vous ressentez une douleur ou une sensibilité de votre dent lors de la mastication (arthrite), il n'y a pas lieu de vous alarmer. Elle sera passagère et s'estompera spontanément, en deux ou trois jours.

De même, un léger gonflement de la joue ou une rougeur de la gencive en regard de votre dent, n'est pas inquiétant.

Si aucune prescription ne vous a été donnée vous pouvez prendre un anti-douleur :

Aspirine ou ibuprofène (Advil Nurofène etc.) en vente libre en pharmacie, à raison de 3 à 4 comprimés par jour .

Si le ciment provisoire de surface s'effrite, il n'y a rien à craindre jusqu'à votre prochain rendez-vous.

Afin de lui rendre son anatomie, son aspect normal et sa solidité, il est nécessaire de restaurer cette dent par une reconstitution coronaire et par une coiffe prothétique.

Si ce traitement est motivé par la présence de kyste (ou granulome ou "abcès"), Il faudra attendre sa guérison et reprendre une radiographie de contrôle après 6 mois.

